

溶出曲線測定例


アスコルビン酸 200 mg / g ・ パントテン酸カルシウム 3 mg / g 配合顆粒

アスコルビン酸

1. 有効成分名：アスコルビン酸 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：200mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


アスコルビン酸 200 mg / g ・ パントテン酸カルシウム 3 mg / g 配合顆粒

パントテン酸カルシウム

1. 有効成分名：パントテン酸カルシウム 2. 剤形：顆粒剤 3. 含量：3 mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

アスコルビン酸 200mg・パントテン酸カルシウム 3mg 配合錠

アスコルビン酸

1. 有効成分名：アスコルビン酸
2. 剤形：錠剤
3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

アスコルビン酸 200mg・パントテン酸カルシウム 3mg 配合錠

パントテン酸カルシウム

1. 有効成分名：パントテン酸カルシウム
2. 剤形：錠剤
3. 含量：3mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

