


溶出曲線測定例

テガフル・ウラシル顆粒（テガフル腸溶顆粒 20%）

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：腸溶顆粒 3. 含量：200mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

テガフル・ウラシル顆粒（ウラシル顆粒 44.8%）

1. 有効成分名：ウラシル 2. 剤形：腸溶顆粒 3. 含量：448mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

テガフル・ウラシルカプセル (テガフル 100mg)

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

テガフル・ウラシルカプセル (ウラシル 224mg)

1. 有効成分名：ウラシル 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：224mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

