


溶出曲線測定例

ナフトピジル錠 25mg a

標準製剤 a

1. 有効成分名：ナフトピジル
2. 剤形：錠剤
3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ナフトピジル錠50mg a

標準製剤 a

1. 有効成分名：ナフトピジル 2. 剤形：錠剤 3. 含量：50mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ナフトピジル錠25mg b

溶
出
率
(%)

標準製剤 b

1. 有効成分名：ナフトピジル
2. 剤形：錠剤
3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ナフトピジル錠50mg b

溶
出
率
(%)

標準製剤 b

1. 有効成分名：ナフトピジル
2. 剤形：錠剤
3. 含量：50mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

