


溶出曲線測定例

フスコデ散 (リン酸ジヒドロコデイン 10 mg / g)


1. 有効成分名：リン酸ジヒドロコデイン 2. 剤形：散剤 3. 含量：10mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

フスコデ散 (d l - 塩酸メチルエフェドリン 20mg / g)


1. 有効成分名: *dl*-塩酸メチルエフェドリン 2. 剤形: 散剤 3. 含量: 20mg/g
4. 試験液: pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数: 75rpm
6. 界面活性剤: 使用せず



溶出曲線測定例

フスコデ散 (マレイン酸クロルフェニラミン 4 mg / g)


1. 有効成分名：マレイン酸クロルフェニラミン 2. 剤形：散剤 3. 含量：4 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

フスコデ錠 (リン酸ジヒドロコデイン 3 mg)


1. 有効成分名：リン酸ジヒドロコデイン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：3 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

フスコデ錠 (d l - 塩酸メチルエフェドリン 7 m g)

1. 有効成分名: *dl*-塩酸メチルエフェドリン 2. 剤形: 錠剤 3. 含量: 7 mg
4. 試験液: pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数: 50rpm
6. 界面活性剤: 使用せず



溶出曲線測定例

フスコデ錠 (マレイン酸クロルフェニラミン 1.5 mg)

1. 有効成分名：マレイン酸クロルフェニラミン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

